

CATALOGUE AGRICULTURE

FERTIMAC

BIOSTIMULANTS





ALGASTIM

ALGASTIM est un bio stimulant liquide formulé à partir des extraits d'algues marines (ascophyllum nodosum) et les oligo-éléments (Zinc, Manganèse, Bore et le Molybdène). **ALGASTIM** doit être apporté pendant tout le cycle de la plante et plus spécialement au moment de la floraison.

COMPOSITION

Extrait d'algues marines :	166.0 g/kg
Substances organique total :	83.0 g/kg
Carbone organique :	48.0 g/kg
Bore :	12.0 g/kg
Manganèse :	4.0 g/kg
Zinc :	4.0 g/kg
Molybdène :	100 ppm

Riche en glycine bétaïne et en polysaccharides

APPLICATION

En foliaire
Cultures maraîchères : 150 à 250 cc/hl
Agrumes et arbres fruitiers : 200 à 300 cc/hl
En injection
Cultures maraîchères : 2 à 3 L/ha

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Porter des gants.
Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



FITAMIN

Solution concentrée en acides aminés, enrichies en minéraux et en substances organiques d'origine végétale. Recommandé pour Stimuler la croissance végétative, Favoriser le développement racinaire, Renforcer la résistance des plantes aux stress (gelée, coup de chaleur, salinité excessive, phytotoxicité).

Concentrated solution of amino acids, enriched with minerals and substances organic of vegetable origin.
Recommended to Stimulate growth vegetative, Promote development root, and to Strengthen the resistance of plants to stress (frost, blow heat, excessive salinity, phytotoxicity).

COMPOSITION

Hydrolysat des protéines (Acides Aminés et polypeptides) :	500 g/kg
Substances organique total :	173.0 g/kg
Carbon organique :	100.0 g/kg

Riche en glycine bétaïne et en polysaccharides

APPLICATION

Maraîchage et fraise

Foliaire :	150 à 250 cc/hL
Injection :	3 à 5 litres/ha

Agrumes et fruitiers

Foliaire :	200 à 350 cc/hL

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.





STIMUL ROOT

ENRACINEUR POUR TOUTES CULTURES

Complexe nutritionnel composé d'une fraction élevée de la matière organique pour amender les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol.
Solution enrichie en acides aminés et en nutriments précurseurs dans le processus d'enracinement recommandée pour améliorer et accélérer le développement des racines et pour renforcer la résistance et la croissance des plantes.

ROOTER FOR ALL CROPS

Nutritional complex composed of a fraction high organic matter to amend the physical, chemical and biological characteristics of the soil.
Solution enriched with amino acids and nutrients precursors in the rooting process recommended to improve and speed up root development and to strengthen resistance and plant growth.

COMPOSITION

Extrait d'algues :	57.0 g/kg
Substances organique total :	165.0 g/kg
Carbone organique :	95.0 g/kg
Manganèse :	4.0 g/kg
Zinc :	4.0 g/kg
Fer :	4.0 g/kg

Riche en glycine bétaïne et en polysaccharides

APPLICATION

Maraîchère et fraise :	5 L à 7 L /ha
Arbres fruitiers et agrumes :	7 à 10 L /ha

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



FRUIT SET

FRUIT SET est un produit qui favorise le développement de système racinaire.
Il est concentré en hormones naturelles indispensables dans la physiologie végétale.
FRUIT SET doit être utilisé surtout après plantation et avant floraison.

COMPOSITION

Glycine betaine :	16 g/L
Extraits algues :	105 g/L
Carbon organique :	53 g/L

Vitamines et substances bioactives: qsp

APPLICATION

Cultures maraîchères : 1 à 2 l/ha
En pépinière : 6 à 10 ml/L d'eau de 1 à 3 applications

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

CORRECTEUR DES CARENCES



MOLYFLEUR

C'est une solution concentrée en molybdène qui agit sur les processus de transformation de l'azote. Il permet d'éviter une accumulation des nitrates dans les feuilles, nourrit la plante, prévient et corrige la déficience en élément molybdène, surtout pour les cultures sensibles en carence de cet élément.

COMPOSITION

Molybdène : 5%

APPLICATION

Cucurbitacées et fraises : 120 à 150 cc/hl
Arbres fruitiers : 150 à 200 cc/hl

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



MOLYBORE

Il s'agit d'un mélange solide de bore et molybdène, avec une haute concentration des extraits d'algues, homogénéisée dans une substance à pouvoir complexant pour lui conférer des propriétés systémiques et favoriser son efficacité et son application.
Sa composition équilibrée lui procure des propriétés d'induction de la floraison, et de la nouaison chez les cucurbitacées (melons, pastèques, etc...)
Son application est conçue pour corriger et prévenir les carences en bore et molybdène en particulier chez les cucurbitacées.

COMPOSITION

Molybdène (Mo): 9%
Bore (B): 9%
Phosphore (P_2O_5): 4%
Extrait d'algues: 15%

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

RECOMMANDATION

Foliaire: 50 à 100 g/hl
Injection: 1 kg/ha par application

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

CORRECTEUR DES CARENCES



BORE 17,5

BORE 17,5 est un fertilisant essentiel pour couvrir les besoins de la plante et prévenir la carence en Bore.
Son usage est préconisé pour promouvoir la production de pollen, assurer la fécondation, réguler la distribution des sucres et la division et la multiplication cellulaires du fruit.

COMPOSITION

Bore micro – granulé ..... 17,5 % (P/p)

APPLICATION

Maraîchage : 100 à 150 g/hl
Betterave, légumineuses : 150 à 300 g/hl
Arbres Fruitiers et Vigne : 150 à 200 g/hl

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau claire
En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.
Tenir hors de portée des enfants.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



OLIGO-MAX

Oligo-MAX est un produit très concentré en micro-éléments essentiels pour la croissance normale des cultures.
Les carences en micro-éléments provoquent un déséquilibre physiologique de la plante qui affecte directement la production en terme de qualité et de quantité.
Oligo-MAX peut être intégré dans un programme de ferti-irrigation dans le but de satisfaire les besoins des cultures en oligo-éléments.

COMPOSITION

Fer :	70.0 g/kg
Zinc :	55.0 g/kg
Manganèse :	40.0 g/kg
Magnesium :	30.0 g/kg
Bore :	10.0 g/kg
Cuivre :	5.0 g/kg
Molybdène :	500 ppm

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

RECOMMANDATION

En injection :
100 à 200 g/hl de bouillie.
Foliaire :
1 à 3 kg/ha chaque semaine.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

CORRECTEUR DES CARENCES



MATRIMIX

Il s'agit d'un mélange solide d'oligo-éléments à base de Zinc, Manganèse, Bore et magnésium avec agent chélateur, qui présente une excellente action translaminaire.
Son application est indiquée pour prévenir et corriger des carences en zinc, manganèse, bore et magnésium spécialement sur les agrumes on peut l'utiliser aussi bien sur vigne, olivier, rosacées et cultures maraîchères.

COMPOSITION

Zinc :	90.0 g/kg
Manganèse :	65.0 g/kg
Magnesium :	25.0 g/kg
Bore :	25.0 g/kg
Acide carboxylique :	40.0 g/kg

APPLICATION

En foliaire: 150 à 250 g/hl
Injection : 3 à 5 kg par application (2 à 3 applications par cycle)

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
Conserver loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



QUALITÉ DES FRUITS



CALIBORE

CALIBORE est une formulation en calcium, enrichie en bore et en biostimulants, recommandée comme apport nutritionnel pour :

- La correction des carences en élément calcium.
- La prévention et correction des troubles physiologiques provoqués par les carences calciques (nécrose apicale, bitterpit, black heart...)
- La correction et l'amélioration de la qualité des fruits.

COMPOSITION

- Calcium : 130 g/kg
- Bore : 2.5 g/kg

APPLICATION

- En foliaire : 200 à 300 cc/hl
- En injection : 4 à 6 litres par hectare

PRÉCAUTION

- Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
- Porter des gants.
- Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
- Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

- Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
- Conserver loin des aliments dans un local aéré.
- Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



FEED-K

- **FEED-K** est un engrais liquide très concentré en potassium facilement assimilable par voie foliaire et radiculaire.
- L'intervention avec **FEED-K** doit coïncider avec les périodes de fort besoin en potassium notamment en phase de grossissement.
- Le potassium apporté par **FEED-K** favorise une meilleure coloration, fermeté et taux de sucre.

COMPOSITION

- Oxyde de potassium : 338.0 g/kg
- Complexé par l'acide carboxylique

APPLICATION

Cultures maraîchères

- Foliaire : 250 à 350 cc/hL
- Injection : 3 à 4 L/ha pendant le grossissement

PRÉCAUTION

- Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau se laver soigneusement avec de l'eau claire.
- Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

- Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
- Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.





FEROS

FEROS contient 4.8% DE FER-EDDHA en position ortho-ortho,
qui est la forme la plus forte et la plus stable du chélate.
FEROS permet d'obtenir une action rapide et systémique optimisant le fonctionnement photosynthétique de la plante.
Il garantit un effet reverdissement rapide grâce à sa forme hautement assimilable.
Il peut s'utiliser en préventif ou en curatif dès l'apparition de symptômes.
FEROS optimise une lutte efficace contre la chlorose ferrique, il est recommandé en culture hydroponique.

COMPOSITION

6% de Fer (Fe)
EDDHA 4.8% (O-O)

APPLICATION

Arboriculture fruitière, Agrumes : 15 – 50 g/arbre
Olivier : 15 – 50 g/arbre
Vigne : 10 – 25 g/pied
Cultures maraîchères : 2 à 3 kg/ha /application

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



NOVAFER

Corrige et prévient la carence des éléments mineurs.
Complexé par des acides aminés.

COMPOSITION

Fer :	5% p/v
Zinc :	2% p/v
Manganèse :	2% p/v
Magnésium :	0,5% p/v
Bore :	0,5% p/v
Cuivre :	0,5% p/v

APPLICATION

En foliaire

Maraîchage :	100 à 200 cc/hl
Arbres fruitiers et Agrumes :	200 à 300 cc/hl

En injection

Maraîchage :	2 à 3 L/ha
Arbres fruitiers et Agrumes :	3 à 5 L/ha

QUALITÉ DES FRUITS



POWER GEL



Formulation de potassium spéciale pour le grossissement, grâce à la présence des molécules organique le potassium devenu plus assimilable par la plante.
Power Gel doit être apporté uniquement par voie racinaire soit seul ou bien en mélange avec les engrais.

COMPOSITION

- Oxyde potassium : 200.0 g/kg
- Azote : 50.0 g/kg
- Zinc : 800 mg/kg
- Bore : 600 mg/kg
- Fer : 2500 mg/kg
- Manganèse : 1000 mg/kg

MODE D'EMPLOI

- Pastèque : 3 à 4 Kg/ha par jour pendant le grossissement de fruit.
- Melon : 2 à 3 Kg/ha par jour pendant le grossissement de fruit.
- Tomate : 4 à 5 Kg/ha 3 fois par semaine.
- Bananier : 3 à 5 Kg/ha 2 fois par semaine.
- Pomme de terre : 5 kg /ha 3 fois par semmaine.
- Poivron : 5 kg /ha 3 fois par semmaine

PRÉCAUTION

- Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
- Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

- Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé.
- Conserver loin des aliments dans un local aéré.
- Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

INDUCTEUR DE RÉSISTANCE

CUIVRE PRO



Cuivre PRO est une formulation liquide à base de cuivre et de zinc.
Le cuivre est un élément essentiel des processus enzymatiques.
Participe activement à la photosynthèse et favorise la fixation de l'azote atmosphérique dans les légumineuses.
Le zinc est un élément important pour la croissance et le développement de la plante.
Il entre dans la composition des enzymes déshydrogénases nécessaires pour la synthèse d'acides aminés, et entre dans la synthèse du tryptophane qui est un précurseur d'auxine.
Cuivre PRO
Convient à toute culture qui nécessite d'améliorer la résistance et la tolérance aux effets négatifs dus à une attaque ou nature fongique, grâce à la stimulation des systèmes de défense naturelle des plantes.
Cuivre PRO est prêt pour l'application foliaire et racinaire et peut être utilisé avec n'importe quelle culture.

COMPOSITION

- Cuivre : 36.0 g/kg
- Zinc : 20.0 g/kg
- Les acides aminées : 6.0 g/kg
- Substances organique total : 130.0 g/kg
- Carbone organique : 80.0 g/kg

Riche en glycine bétaïne et en polysaccharides

APPLICATION

En foliaire

- Culture maraîchères : 200 à 250 cc/hl
- Agrumes et arbres fruitiers : 200 à 300 cc/hl

En injection

- 3 à 5l pour toutes les cultures.

PRÉCAUTION

- Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau se laver soigneusement avec de l'eau claire.
- Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

- Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
- Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

PEROGINE



Désinfectant à large efficacité

- Désinfectant à action rapide et sans résidus.
- Traitement pour désinfection à large spectre sur les champignons et les bactéries.
- L'oxygène élémentaire décomposé par le peroxyde d'hydrogène s'attaque par contact direct aux parois cellulaires des micro-organismes.

COMPOSITION

- Peroxyde d'hydrogène : 20 % (P/V)
- Acide acétique : 5 % (P/V)
- Riche en acide peracétique

APPLICATION

- Désinfection des serres : 2%
- Maraîchage : 5 Litre/Ha inj
- En foliaire : 3 Litre

PRÉCAUTION

- Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
- Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

- Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé, loin des aliments dans un local aéré.
- Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

INDUCTEUR DE RÉSISTANCE

BACTI PLUS



BACTI PLUS est un produit liquide à base de Gluconate de Cuivre. L'application de cette formulation donne aux cultures une grande résistance face à certaines maladies telles que :
Œil de paon, mildiou, pourriture brune, gommose, cloque,...

COMPOSITION

Cuivre (Cu) ..... 60 g/l
Bio-activateur .... q s p

APPLICATION

En foliaire
Olivier : 100–150 cc/hl (2 à 3 applications par cycle)
Vigne et rosacées : 75–150 cc/hl (2 à 3 applications par cycle)
Agrumes : 100–200 cc/hl (1 à 2 applications par cycle)
Maraîchage : 75–150 cc/hl (2 à 3 applications par cycle)
En injection
En moyenne 1 à 3 L/ha pour toutes les cultures.

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



AMENDEMENTS ORGANIQUE



ORGASOL

Amendement liquide concentré en matière organique D'origine végétale a pour objectif de :
Améliorer la fertilité du sol.
Valoriser les réserves du sol.
Activer la vie microbienne du sol.
Améliorer l'assimilation des nutriments.

COMPOSITION

Matière organique :	50%
Azote organique :	qsp

MODE D'APPLICATION

INJECTION : 5 à 10 l / ha par application

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé, loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



ORGA FORT

Amendement liquide concentré en matière organique d'origine végétale a pour objectif de:
Améliorer la fertilité du sol.
Valoriser les réserves du sol.
Activer la vie microbienne du sol.
Améliorer l'assimilation des nutriments.

COMPOSITION

Matière organique : 50% (P/V)

APPLICATION

Injection : 5 à 10 L/ha par application

PRÉCAUTION

Eviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin desaliments dans un local aéré.
Eviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.

AMENDEMENTS ORGANIQUE



FULVISTAR

FULVISTAR est un activateur de sol, riche en substances humique et fulvique choisi spécialement pour améliorer les caractéristiques physiques et chimiques du sol.
Parmi ses caractéristiques, on cite principalement :

l'amélioration de la structure du sol.
l'augmentation de la capacité d'échange cationique.
la stimulation de la microflore du sol.
l'augmentation de la capacité de rétention en eau.
l'amélioration du pH du sol qui favorise une meilleure assimilation des éléments nutritifs.

COMPOSITION

Acide humique et fulvique : 15%
Oxyde de potassium : 12%

PRÉCAUTION

Éviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.
Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.

RECOMMANDATION

Cultures maraîchères et bananier : 70 à 100 L/ha / cycle.
Agrumes et arbres fruitiers : 50 à 80 L/ha / cycle.

STOCKAGE DU PRODUIT

Conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Éviter de stocker le produit à une température supérieure à 30°C.



INSICTICIDE ET NEMATICIDE BIO

FERTICIDE



Ce produit utilisé contre les insectes nuisibles tels : Pucerons, la mouche blanche, les Acariens, tuta absoluta...

COMPOSITION

Extrait des plantes :
Thymus vulgaris, Ononis natrix, Lawsonia inermis, Ricinus communis, Argania spinosa, Urtica dioica et Peganum harmala

Dose : 5 Litres
5cc /L d'Eau

FERTINEM



ENRACINEUR ANTISTRESS NATUREL

COMPOSITION	TENEUR %
Magnésium (Mg)	= 0.02070
Manganèse (Mn)	= 0.03200
Fer (Fe)	= 0.03170
Calcium (Ca)	= 0.15000
Soufre	= 5.39 %
PH	= 12.03

COMPOSITION	TENEUR %
Cuivre (Cu)	= 0.00002
Molybde (Mo)	= 0.00005
Zinc (Zn)	= 0.00212
Bore (B)	= 0.00071
C.E ms/cm	= 36

Volume : 5 Litres
5 L en 1 Hectare





FERTIMAC

C/O 2EME ETG BUREAU 04 EXTENTION HAY ZAITOUNE N° 56,TIKIOUINE AGADIR

fertimac@gmail.com

+212 661 853466